**Op. Dr. Sina Kaderi**

Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Adresse : Avenue Bağdat, Bostancı – Istanbul, Turquie

Téléphone : +90 501 062 03 03 | E-mail : info@sinakaderi.com | Site web : www.sinakaderi.com

# LIFTING CHIRURGICAL DES LÈVRES (LIP LIFT) — FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

**Date / Heure :** .....

**Nom et prénom du patient :** .....

**Date de naissance :** .....

**Numéro de carte d'identité / passeport :** .....

**Date de l'intervention :** .....

**Intervention prévue :**

☐ Extended Lip Lift (lifting étendu de la lèvre supérieure)

☐ Lower Lip Lift (lifting de la lèvre inférieure)

☐ Corner Lip Lift (lifting des commissures labiales)

☐ Chirurgie de révision : .....

☐ Intervention combinée : .....

**Anesthésie :**

☐ Anesthésie locale

☐ Anesthésie générale

## 1. DESCRIPTION ET OBJECTIF DE L'INTERVENTION

Le Lip Lift est une intervention chirurgicale visant à raccourcir la distance entre la base du nez et la lèvre supérieure et à repositionner cette dernière.

Une incision est réalisée le long des plis naturels situés à la base du nez, puis une quantité de peau préalablement déterminée est retirée.

L'objectif est d'améliorer le contour des lèvres, la visibilité du vermillon (partie rouge de la lèvre) et l'harmonie des proportions du visage.

Je comprends que le résultat dépend de mes particularités anatomiques et qu'aucune forme précise des lèvres ne peut être garantie.

## 2. TECHNIQUE CHIRURGICALE ET INTERVENTION SUR LE MUSCLE

Le Lip Lift classique (Bullhorn Lip Lift) comprend généralement une excision cutanée et une fixation des tissus.

Selon les caractéristiques anatomiques du patient, l'Extended Lip Lift peut nécessiter une dissection plus étendue, une fixation des tissus mous profonds, un prolongement latéral de l'incision et, si nécessaire, une dissection, un remodelage ou une fixation par sutures du muscle orbiculaire de la bouche (orbicularis oris).

Toutes ces manœuvres chirurgicales ne sont pas systématiquement réalisées chez chaque patient.

Il m'a été expliqué qu'une intervention sur ce muscle peut modifier les mouvements des lèvres.

## 3. RISQUES ET COMPLICATIONS POSSIBLES

**Cicatrices et cicatrisation :** Une cicatrice chirurgicale permanente subsistera à la base du nez. Elle peut s'élargir, changer de couleur, devenir visible, surélevée ou déprimée. Une désunion de la plaie, un retard de cicatrisation et, plus rarement, une perte de tissu peuvent survenir.

**Forme et symétrie :** Une asymétrie des lèvres, des irrégularités du contour, une élévation excessive ou insuffisante, une exposition excessive des dents supérieures, des modifications de la forme des ailes du nez ou des narines ainsi qu'une insatisfaction esthétique peuvent apparaître.

**Fonction et sensibilité :** Des difficultés à fermer les lèvres, des modifications du sourire, de la parole ou des mouvements de pincement des lèvres, des sensations de tension, une rigidité, un engourdissement, des picotements ou une perte de sensibilité peuvent survenir.

Des modifications fonctionnelles, notamment après une intervention sur le muscle, peuvent être temporaires et, plus rarement, permanentes.

**Risques chirurgicaux généraux :** Des saignements, un hématome, une infection, des réactions allergiques, une formation de tissu cicatriciel ou une fibrose, des troubles de la

circulation sanguine ainsi que des complications liées à l'anesthésie peuvent survenir. Une réactivation de l'herpès labial est possible chez les patients ayant des antécédents de boutons de fièvre.

**Chirurgie de révision :** Un traitement complémentaire ou une intervention de révision peut être nécessaire en cas de résultat esthétique insatisfaisant ou de complications. Une correction complète ne peut être garantie et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

## 4. ALTERNATIVES ET LIMITES DES RÉSULTATS

Les alternatives comprennent l'absence d'intervention chirurgicale, les injections de produits de comblement dans les cas appropriés ou d'autres techniques d'embellissement des lèvres.

Les produits de comblement ne permettent pas de raccourcir chirurgicalement un philtrum allongé.

Le Lip Lift entraîne une modification anatomique permanente. Cependant, le vieillissement naturel et les modifications des tissus se poursuivent.

Une symétrie parfaite, une cicatrice totalement invisible et un résultat inchangé tout au long de la vie ne peuvent être garantis.

## 5. RÉCUPÉRATION ET SOINS POSTOPÉRATOIRES

Un œdème, des ecchymoses et une sensibilité locale peuvent apparaître durant les premiers jours. Ces manifestations diminuent généralement en 7 à 10 jours.

L'assouplissement des tissus peut prendre plusieurs mois, tandis que la maturation de la cicatrice nécessite généralement 6 à 12 mois, voire davantage.

Je comprends que je dois éviter tout étirement excessif des lèvres et respecter les recommandations concernant les soins de la plaie, la prise des médicaments, l'arrêt de la nicotine, la protection solaire et les consultations de suivi.

Je dois consulter immédiatement un professionnel de santé en cas d'aggravation de la douleur, de saignement, de fièvre, d'écoulement au niveau de la plaie, de gonflement augmentant rapidement ou de changement de couleur des tissus.

## 6. DÉCLARATION ET CONSENTEMENT DU PATIENT

Je confirme avoir communiqué de manière exacte mes antécédents médicaux, les médicaments que je prends, mes allergies, ma consommation de tabac ou de nicotine ainsi que mes interventions médicales ou chirurgicales antérieures.

La technique opératoire, les alternatives possibles, la présence d'une cicatrice permanente, les risques d'asymétrie, les modifications possibles de la forme et des mouvements des lèvres ou

du nez, les complications éventuelles ainsi que les risques de chirurgie de révision m'ont été expliqués dans un langage clair et compréhensible.

J'ai eu la possibilité de poser toutes mes questions.

Je comprends que j'ai le droit de refuser l'intervention et de retirer mon consentement à tout moment avant le début de celle-ci.

**Nom et prénom du patient :** .....

**Signature :** .....